

## \_어린이 생물도감

: 2026 1 16 7:06



꿩의다리 / *Thalictrum aquilegifolium* var. *sibiricum* Regel & Tiling

| 구분   | 설명    |
|------|-------|
| 생물분류 | 식물    |
| 속국명  | 꿩의다리속 |

|      |  |
|------|--|
| 과국명  | 미나리아재비과  |
| 과명   | Ranunculaceae  |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 미나리아재비과의 여러해살이풀로 전국에서 볼 수 있으며 유럽과 아시아의 북온대 및 아한대에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 전도에 나며 구아대륙의 북온대 및 아한대에 분포한다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀이다.</p> <p>크기 : 높이는 50~100cm이다.</p> <p>꽃색 : 백색, 자주색, 붉은색</p> <p>개화기 : 7월, 8월</p> <p>잎은 어긋나고 아래에 나는 것은 잎자루가 길지만 위로 갈수록 짧아져 없어진다. 2~3회 깃털모양으로 갈라지며 제 1, 2마디의 작은 잎에 턱잎이 있다. 작은 잎은 거꿀달걀모양 또는 둥근 심장모양이고 3~4개로 갈라지며 원두이다.</p> <p>꽃은 7~8월에 흰색 또는 붉은색으로 피고 줄기 끝에 편평꽃차례로 달린다.</p> <p>꽃잎은 없고 꽃받침조각은 4~5개로 원래의 시기보다 빨리 떨어지는 성질이 있다. 수술이 많고 고리모양으로 배열되어 있다.</p> <p>열매는 수과로 5~10개씩 달리고, 날개 모양으로 튀어나온 것이 3~4개 있으며 거꿀달걀모양 또는 타원모양이다.</p> <p>줄기는 곧게 서고 가지가 갈라져 나온다. 원줄기는 모가진 선이 있으며 속이 비었고 초록색, 자주색 바탕에 흰색이 섞여 있다.</p> <p>산에서 자란다.</p> |