



넓은잎꼬리풀 / *Veronica kiusiana* Furumi

구분	설명
생물분류	식물
속국명	꼬리풀속
과국명	현삼과

과명	Scrophulariaceae
일반특징	<p>요약설명 : 현삼과 여러해살이풀로 우리나라의 남산 및 전라남도 무등산에서 자라며, 주로 금강산을 기준으로 북쪽 지역에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 남산 및 전남 무등산에서 자라고 주로 금강산 이북에서 자란다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀이다.</p> <p>크기 : 높이 50~70cm이다.</p> <p>꽃색 : 파란색</p> <p>개화기 : 8월, 7월</p> <p>잎은 마주나기하고 세모난 달걀모양 또는 좁은 삼각형이며 끝이 뾰족하다. 밑부분이 수평하거나 얇은 심장모양이다. 잎의 양면에는 퍼진 긴 털이 흩어져 있지만 겉면에는 짧은 돌기로 남으며, 가장자리에 뾰족하고 작은 톱니가 있다.</p> <p>꽃은 7~8월이 되면 하늘색으로 핀다. 줄기의 윗부분에 촘촘히 모여 총상꽃차례를 이룬다. 꽃차례에는 부드러운 짧은 털이 있다. 꽃자루는 긴 털이 있으며, 꽃받침보다 길다. 꽃받침은 4개로 깊게 갈라진다. 꽃받침조각은 좁은 달걀모양이고, 가장자리에는 털이 있다. 꽃잎 전체는 4개로 깊게 갈라진다. 암술대는 꽃잎 전체의 바깥으로 뻗으며 수술은 2개이다.</p> <p>열매는 삭과고 꽃받침에 싸인다. 줄기에는 처음에 부드러운 다세포의 털이 나 있다. 높이는 50~70이고 곧게 선다.</p> <p>산지에서 자란다. 줄기가 굵고 곧게 서며 꽃이 촘촘하게 이삭모양의 총상꽃차례를 이루는 것이 개불알풀속과의 차이점이다.</p>