



: 2026 1 16 6:59



네발나비 / *Polygonia c-aureum* (Linnaeus, 1758)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	네발나비속
과국명	네발나비과

과명	Nymphalidae
일반특징	<p>여름형은 날개 윗면이 황갈색으로 검은색의 점무늬가 있으며, 아랫면은 연한 황갈색 바탕에 갈색의 가는 줄무늬가 있다. 가을형은 날개 윗면이 붉고 아랫면은 짙은 적갈색이다. 암컷의 경우 날개 가장자리가 둥글게 보이며, 무늬에 의한 암수구별이 어렵기 때문에 배끝의 모양을 살펴봐야 확실하게 알 수 있다.</p> <p>낮은 계곡 주변이나 강가 등에 살며 매우 흔하게 관찰된다. 여름형과 가을형은 날개의 색이나 모양에서 차이가 있다. 주로 여름형은 나무 진액에 모여들고, 가을형은 구절초, 산국 등의 꽃에서 꿀을 빨아 먹으며 떨어진 감의 과즙을 먹는 경우도 있다. 여름형은 6월~8월, 가을형은 다음해 5월, 중부 지방의 경우 2~3회, 남부 지방에서는 3~4회 나타난다. 성충의 상태로 겨울을 난다.</p>